


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة فرحت عباس سطيف ١
مصلحة الطب الوقائي



التلقيح - حماية - للجميع


- اعلام الطبيب بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح.
- إخبار الطبيب بالتاريخ المرضي بالتفصيل والأدوية التي يأخذها المريض.
- إخبار الطبيب حول حدوث أي رد فعل تحسسي مع أي لقاحات أو أدوية.

بعد كم من الوقت يبدأ مفعول اللقاح ضد الكوفيد؟

تتضمن اللقاح ضد الكوفيد-19 جرعتين، ولا تتم الحماية الكاملة الا بعد 15 يوما من تلقي الجرعة الثانية منه ، لذلك يوصى بالاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية من لبس الكمامه وتعقيم اليدين والتبعيد الجسدي حتى بعد تلقي التلقيح.

هل يمكن تبادل لقاحات كوفيد-19 أو استبدالها؟

- كلا ، اذا تلقيت الجرعة الأولى من لقاح معين يجب أن تتلقى الجرعة الثانية من نفس اللقاح وليس من لقاح آخر.



لذلك من الضروري الاحفاظ ببطاقة التلقيح

واستحضارها عند تلقي الجرعة الثانية.

من أصيب بمرض كوفيد ، هل يجب عليه تلقي اللقاح؟

- يوصى بترك مدة 03 أشهر بعد الإصابة بالمرض من أجل تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، وكذلك من أصيب بالمرض بعد تلقي الجرعة الأولى.